

Продолжаем знакомить аграриев с вредителями посевов.

Пшеничный трипс.

Специалисты филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Тульской области информируют, при проведении фитосанитарного обследования обнаружено заселение посевов озимых зерновых (пшеница) - пшеничным трипсом.

Всего обследовано 5,44405 тыс.га, сельскохозяйственных культур, заселено 3,734 тыс. га. Средневзвешенная численность составила 6,18 экз. на 100 взмахов сачком.

Взрослое насекомое бурого или черного цвета, с двумя парами крыльев, затемненных у основания. Длина тела пшеничного трипса от полутора до двух мм. Ротовые органы у трипса сосущие. Яйца белые, очень мелкие. Личинки тёмно-красного цвета, с двумя щетинками на последнем сегменте.

Трипсы повреждают пшеницу яровую и озимую, реже рожь. Они высасывают соки из зерен пшеницы (реже из зёрен других растений) и колосковых чешуек, что приводит к недоразвитию колоса, в результате этого чешуйки обесцвечиваются, а зерно становится щуплым и лёгким.

Экономический порог вредоносности определяется в конце налива – начале молочной спелости зерна и устанавливается при наличии 40–50 личинок на одном колосе.

Убедительная просьба вести постоянный мониторинг посевов, при выявлении вредных объектов численностью, приближающейся к ЭКОНОМИЧЕСКОМУ ПОРОГУ ВРЕДНОСНОСТИ провести обработку пестицидами, строго соблюдая регламент применения.

По всем интересующим вопросам обращаться в отдел защиты растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Тульской области по телефону (4872)70-46-85 или в районные и межрайонные отделы филиала.